

Indicaciones Pre Colocación de Balón intragástrico Ingerible y excretable

Procedimiento Bariátrico Colocación bajo Fluoroscopia (rayos x en movimiento) de Balón Intra- Gástrico, sin Endoscopia, sin anestesia, Para el Tratamiento de Obesidad Se ha decidido la realización de un procedimiento bariátrico de colocación de Balón Intra-Gástrico ingerible y excretable, que consiste en ingerir una cápsula que contiene el balón, a través de la boca como se ha explicado en consultas previas, de acuerdo a su índice de masa corporal y comorbilidades que usted tenga con el objetivo de alcanzar en 4 meses una reducción de su peso inicial del 10 al 15 % ó más, siempre y cuando siga todas las instrucciones que le indicamos.

Debe saber que volumen insertado en el balón es de 550 ml de una solución especial diseñada por el fabricante del balón, el 99% de las veces el balón se vacía sólo a los 4 meses de colocado y usted lo va eliminar de su cuerpo a través de las heces más del 30% de los pacientes no perciben cuando evacuan el balón.

Usted ya debió haber recibido una báscula smart, junto con un reloj de actividad física diario, además ya debió haberse entrevistado por 1era vez con el Couching Físico y nutricional así como haber disipado todas sus dudas en cuanto al funcionamiento de los dispositivos electrónicos, seguimientos de consultas y peso inicial compartamental antes de **colocar el balón intragástrico ingerible.**

El costo de tratamiento incluye además 6 citas en consultorio o consultorio virtual, 14 sesiones con el couching físico y nutricional. Recomendamos que continúe al menos por 1 año en seguimiento tanto médico, como con su asesor físico y nutricional.

Por lo cual **requerimos** que llene el formulario de Consentimiento Operatorio para el Procedimiento de Colocación de Balón intra gástriintoleranco que hemos acordado en la consulta, que puede encontrar en esta Web (www.obesidadpanama.com), seguir las indicaciones pre operatorias que le damos y ante cualquier duda notificarnos.

- NO es necesario realizar una Dieta Líquida exclusivamente sin carbohidratos, sin azúcar, días antes del procedimiento, pero si es necesario iniciar medicación anti náuseas que le será prescrito en una receta y que debe iniciar un día antes.
- Ayuno aproximadamente 8 horas antes del procedimiento, si el procedimiento es en horas de la mañana no tomar ni agua después de las 11:00 PM. Si el procedimiento es en horas de la tarde tomar un desayuno ligero sin grasas y que sea 8 horas antes de la cirugía (jugos de manzana)
- Si usted toma medicamentos para la presión alta, puede y debe tomarlos con 30 cc de agua (1/4 de vaso de agua) al despertar en la mañana.
- Si usted toma medicamentos para la diabetes (azúcar en sangre) no los tome el día de la cirugía, pero avise a su médico. • Si usted toma antiinflamatorios como (aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, alka-selzer, arcoxia, flamidol etc.) deben ser suspendidos 15 días antes del procedimiento y debe consulta con su médico si los puede volver a tomar.
- Los antiinflamatorios inhiben el proceso de coagulación por lo que debe notificar a su medico si aún los está tomando. Si usted ingiere jengibre, té verde, Giessen, debe suspenderlos igualmente 15 días antes de la cirugía y avisar a su medico, ya que estas sustancias también influyen en la coagulación.
- Debe llevar ropa cómoda y que no apriete.
- Debe acudir con un familiar o amigo de confianza al procedimiento.
- Debe presentarse al área de radiología 30 minutos antes de la hora del procedimiento y notificarse con la secretaría de radiología., entregar toda la documentación, el consentimiento informado impreso y firmado.
- En caso de sentirse resfriado(a) desde el día anterior a su cirugía favor notificar a su medico para decidir si se puede realizar el procedimiento.

Firma y Documento del Paciente

Firma y Documento del Testigo