

Indicaciones Pre operatorias Funduplicatura de Nissen + Plicatura Gástrica Esta es una cirugía anti-obesidad y anti-reflujo

Se ha decidido la realización de una cirugía anti-obesidad y anti-reflujo, reservada para Pacientes que tienen obesidad y padecen de reflujo, En ésta técnica se realiza en dos pasos primero la cirugía anti reflujo que involucra Descender el estómago del tórax si está herniado, Cerrar la hernia hiatal (hernia del diafragma) si la tiene, entonces realizar la Funduplicatura de Nissen para crear la válvula anti reflujo externa una vez concluido estos pasos, procedemos en aplicar la Curvatura mayor del estómago disminuyendo la capacidad Gástrica entre un 75 a 80 % de su capacidad

Y disminución del apetito la desvascularizar el fundus y la Curvatura mayor, siempre y cuando siga todas las instrucciones que le indicamos, es importante que continúe con control durante al menos 5 años después de la cirugía, eso nos garantiza un éxito alto del procedimiento.

Por lo cual requerimos que llene el formulario de Consentimiento Operatorio para la Cirugía que hemos acordado en la consulta, que puede encontrar en esta Web (www.obesidadpanama.com), seguir las indicaciones pre operatorias que le damos y ante cualquier duda notificarnos.

- Dieta Líquida exclusivamente sin carbohidratos, sin azúcar, días entes de la cirugía, NO es necesario realizarlo
- Ayuno aproximadamente 8 horas antes de la cirugía, si la cirugía es en horas de la mañana no tomar ni agua después de las 11:00 PM. Si la cirugía es en horas de la tarde tomar un desayuno liguero sin grasas y que sea 8 horas antes de la cirugía (jugos de manzana)
- Si usted toma medicamentos para la presión alta, puede y debe tomarlos con 30 cc de agua (1/4 de vaso de agua) al despertar en la mañana.
- Si usted toma medicamentos para la diabetes (azúcar en sangre) no los tome el día de la cirugía, pero avise a su médico.
- Si usted toma antiinflamatorios como (aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, alka-selzer, arcoxia, flamidol etc.) deben ser suspendidos 15 días antes de la cirugía. Los anti-inflamatorios inhiben el proceso de coagulación por lo que debe notificara su médico si aún los está tomando. Si usted ingiere jengibre, té verde, Ginseng, debe suspenderlos igualmente 15 días antes de la cirugía y avisar a su médico, ya que estas sustancias también influyen en la coagulación.
- No rasurar el área que se va ha operar (se han demostrado menos infecciones del área quirúrgica con ésta técnica).
- Debe llevar ropa cómoda y que no apriete.
- Debe acudir con un familiar o amigo de confianza a la cirugía.
- Debe admitirse al hospital dos (2) horas antes de la hora programada para cirugía, entregar toda la documentación en admisión, así como los exámenes de laboratorios (copia), debe entregar la pre autorización de cirugía por su aseguradora si tiene seguro médico, copias de estudios y exámenes realizados para la preparación de la cirugía, el consentimiento informado impreso y firmado.
- En caso de sentirse resfriado(a) desde el día anterior a su cirugía favor notificar a su médico para decidir si se puede realizar la cirugía.